

Catálogo de Produtos

TEUTO —
HOSPITALAR

Ciência viva pela saúde



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA





O mais completo parque farmacêutico da América Latina

1 milhão m² de área total





SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

Saúde, bem-estar e qualidade de vida.

Há mais de 7 décadas no coração do Brasil, com o mais completo parque farmacêutico da América Latina e pioneiro na produção de medicamentos genéricos no Brasil, o Teuto é referência para o mercado nacional e internacional e se consolida como uma solução completa em saúde.

Atualmente, a companhia possui mais de 540 produtos registrados entre medicamentos de referência, genéricos, similares equivalentes – EQ's, MIP's (medicamentos isentos de prescrição), linha de especialidades, que incluiu os biossimilares. Além

disso, temos os suplementos alimentares, cosméticos e produtos para a saúde. Nos próximos anos, está programado o lançamento de mais de 250 novas apresentações.

O laboratório, que é sinônimo de qualidade e confiança, proporciona mais qualidade de vida aos seus clientes, colaboradores e parceiros, por meio da excelência na pesquisa, no desenvolvimento, fabricação e comercialização de seus produtos, e valoriza a responsabilidade socioambiental, reafirmando que “SE É TEUTO, É DE CONFIANÇA”.





SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

Há mais de 7 décadas no coração do Brasil.

Atualmente, a companhia possui mais de 540 produtos registrados entre medicamentos de referência, genéricos, similares equivalentes – EQ's, MIP's (medicamentos isentos de prescrição), linha de especialidades, que incluiu os biossimilares. Além disso, temos os suplementos alimentares, cosméticos e produtos para a saúde. Nos próximos anos, está programado o lançamento de mais de 250 novas apresentações.



biOncologia Teuto



Em cada ciclo de vida,
mais tempo para
viver bem.

Pegneucyte é um biossimilar aprovado pela ANVISA com semelhança demonstrada com o pegfilgrastim de referência.

Pegneucyte pode oferecer maior acesso em comparação com o pegfilgrastim² de referência, ao mesmo tempo que oferece segurança, eficácia e tolerabilidade comparáveis.

PEGNEUCYTE
BIOSSIMILAR PEGFILGRASTIM

biOncologia Teuto é a proposta para acelerar o acesso e uso de BIOssimilares para os tratamentos Oncológicos no Brasil, disponibilizando medicamentos complexos a um custo acessível, sendo um pilar importante na sustentabilidade do sistema de saúde brasileiro.

Nós estamos iniciando esta jornada com o Pegfilgrastim, mas muito mais produtos virão pela frente.



Simbeva®

BEVACIZUMABE

SIM, sempre é tempo de viver bem.

SIMBEVA® é um biossimilar aprovado pela ANVISA com eficácia e segurança altamente semelhantes ao produto biológico comparador.†

embalagem meramente ilustrativa



INDICAÇÕES:



Câncer colorretal metastático



Câncer de pulmão de não pequenas células localmente avançado, metastático ou recorrente



Carcinoma de células renais metastático



Câncer epitelial de ovário, tuba uterina e peritoneal primário



Câncer de colo do útero



Câncer de mama metastático ou localmente recorrente

†Socinski MA, Waller CF, Idris T, et al. Phase III double-blind study comparing the efficacy and safety of proposed biosimilar MYL-14020 and reference bevacizumab in stage IV non-small-cell lung cancer. Ther Adv Med. 2021;13:17588359211045845.

Março/24

MS. 1.0370.0790 - Bevacizumabe - Sol. injetável 25 mg/mL Fr. Amp de 16 mL (400mg) ou de 4 mL (100mg).

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Simbeva®, é indicado no tratamento de diversos tipos de câncer, associado com outras substâncias quimioterápicas, sendo os principais tumores elegíveis para o uso de Simbeva: carcinoma colorretal metastático; câncer de pulmão de não pequenas células, não escamoso, irressuscitável, localmente avançado, metastático ou recorrente; câncer de mama diversos; câncer de células renais avançado e/ou metastático; câncer epitelial de ovário, tuba uterina e peritoneal primário avançado; tratamento de câncer de colo do útero persistente, recorrente ou metastático. **2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?** é contraindicado a pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente do produto, a produtos de células de ovário de hamster chinês ou a outros anticorpos recombinantes humanos ou humanizados. Não houve estudo adequado em gestantes, sabe-se que IgGs cruzam a barreira placentária e que Simbeva® pode inibir a angiogênese no feto. No período pós-comercialização, foram observados casos de anormalidades fetais em mulheres tratadas com bevacizumabe isolado ou em combinação com quimioterápicos embriotóxicos já conhecidos. Portanto, Simbeva® não deve ser usado durante a gravidez. Em mulheres com potencial para engravidar, medidas contraceptivas devem ser utilizadas durante e por 6 meses após o término do tratamento. O Simbeva® pode prejudicar a fertilidade feminina. Após descontinuação do tratamento com bevacizumabe, as funções ovarianas foram recuperadas na maioria das pacientes. Os efeitos do tratamento com bevacizumabe a longo prazo são desconhecidos. **3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:** Para aumentar a rastreabilidade dos medicamentos biológicos, o nome comercial e o número de lote do produto administrado devem ser claramente registrados (ou declarados) no prontuário médico do paciente. Os pacientes podem ter risco aumentado para o desenvolvimento de fistula quando tratados com bevacizumabe, risco aumentado de hemorragia, especialmente hemorragias associadas ao tumor, incidência aumentada de hipertensão, a incidência de tromboembolismo arterial, incluindo acidente vascular cerebral, ataque isquêmico transitório e infarto agudo do miocárdio, foi maior em pacientes que receberam bevacizumabe em combinação com quimioterapia, em comparação aos pacientes que receberam apenas quimioterapia, risco de desenvolver eventos tromboembólicos venosos, incluindo embolia pulmonar, índices aumentados de neutropenia grave, neutropenia febril ou infecção com neutropenia grave (incluindo óbito) foram observados, bevacizumabe é embriotóxico e teratogênico quando administrado a coelhas, bevacizumabe não é aprovado para uso em pacientes abaixo de 18 anos. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** Não foi observada interação relevante da quimioterapia coadministrada na farmacocinética de bevacizumabe. **4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?** Retire a quantidade necessária de bevacizumabe e dilua em um volume necessário para administração com 0,9% de uma solução de cloreto de sódio. A faixa de concentração da solução de bevacizumabe final deve ser mantida entre 1,4 e 16,5 mg/mL. Despreze a sobra deixada no frasco-ampola, pois este medicamento não contém conservantes. Inspeção visualmente quanto à presença de partículas e alterações de coloração do líquido antes da administração. Não administrar em injeção intravenosa direta ou em bolus. A dose inicial de Simbeva® deve ser administrada em 90 minutos, em infusão intravenosa. Se a 1ª infusão for bem tolerada, a 2ª pode ser administrada durante 60 minutos. Se em 60 minutos for bem tolerada, todas as infusões subsequentes podem ser feitas em 30 minutos. Na bula estão descritas as dosagens padrão e demais orientações de uso para tipo de câncer. O médico irá acompanhar o tratamento e proceder aos ajustes necessários. **5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?** Os eventos adversos mais graves foram: Perifurações gastrointestinais; Hemorragia, incluindo hemorragia pulmonar / hemoptise; Tromboembolismo arterial; análises dos dados de segurança clínica sugerem que as ocorrências de hipertensão e proteinúria durante o tratamento com Bevacizumabe são, provavelmente, dose dependente. Os eventos adversos mais frequentemente observados em todos os estudos clínicos com pacientes que recebem bevacizumabe foram hipertensão, fadiga ou astenia, diarreia e dor abdominal. Várias outras reações adversas estão descritas na íntegra na bula. Leia a bula. **6. Uso intravenoso. Uso adulto. Venda sob prescrição médica. Uso restrito a hospitais.**



 biOncologia Teuto

Pegneucyte

Pegfilgrastim

(Fator Estimulador de Colônias de Granulócitos)

Sol. Inj. 10mg/mL ct Vd Trans Preenc x 0,6mL - MS. 1.0370.0781.001-0

cód: 4301

Pegneucyte™ é indicado para redução na duração da neutropenia e da incidência de neutropenia febril em pacientes tratados com quimioterapia citotóxica para malignidade (exceto leucemia mieloide crônica e síndromes mielodisplásicas).

Produto biológico comparador: Neulastim - Amgen

Simbeva

Bevacizumabe

(Anticorpos Monoclonais Humanizados)

25mg/mL Sol. Dil. In. Fus. Iv. Ct. Fa. Vd. Trans. x 4mL - MS. 1.0370.0790.001-1

cód: 3730

25mg/mL Sol. Dil. In. Fus. Iv. Ct. Fa. Vd. Trans. x 16mL - MS. 1.0370.0790.002-8

cód: 0570

Simbeva é indicado para o tratamento de câncer colorretal metastático, câncer de pulmão de não pequenas células localmente avançado, metastático ou recorrente, câncer de mama metastático ou localmente recorrente, câncer de células renais metastático e/ou avançado (mRCC), câncer epitelial de ovário, tuba uterina e peritoneal primário e câncer de colo do útero.

Produto biológico comparador: Avastin - Roche



TEUTO —
HOSPITALAR
Ciência viva pela saúde

Dipirona

(Analgésico e Antipirético)

Solução Injetável 500mg/mL com 120 ampolas de 2mL - MS. 1.0370.0470.005-2

cód: 2658

Este medicamento é indicado como analgésico (medicamento para dor) e antitérmico (medicamento para febre).

Referência: Novalgina - Sanofi Medley

Ropivacaína

(Anestésico Local)

Solução Injetável 10mg/mL com 5 ampolas de 20mL - MS. 1.0370.0633.010-4

cód: 6849

Solução Injetável 7,5mg/mL com 5 ampolas de 20mL - MS. 1.0370.0633.004-1

cód: 6848

O cloridrato de ropivacaína é indicado para: Anestesia em cirurgia: bloqueio peridural, incluindo cesárea; bloqueio nervoso maior; bloqueios infiltrativos e do campo operatório. Estados dolorosos agudos: infusão peridural contínua ou administração intermitente em bolus, como por exemplo, em dor pós-operatória ou trabalho de parto; bloqueios infiltrativos e do campo operatório; injeção intra-articular; bloqueio nervoso periférico em infusão contínua ou em injeções intermitentes, como por exemplo, em dor pós-operatória. Estados dolorosos agudos em pediatria. Para o controle da dor pré e pós-operatória em: bloqueio peridural caudal.

Referência: Naropin - Aspen Pharma



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

TEUTO
HOSPITALAR
Ciência viva pela saúde

Pipta

*(Piperacilina sódica
+ Tazobactam sódico)*

Referência: Tazocin - Wyeth



A penicilina de amplo espectro
mais consumida no mercado hospitalar,*
agora disponível no Laboratório Teuto.

*Close-Up RM (Retail Market) Edição YTD 12/2023 Doses

MS.-1.0370.0788 – Pipta - Piperacilina sódica + Tazobactam sódico - pó liofilizado p/ sol. injetável 4 g + 0,5 g c/10 FA e pó liofilizado p/ sol. injetável 2 g + 250 mg c/10 FA. É indicado para tratamento de infecções bacterianas sensíveis a ação do produto. Contraindicação: O uso de Pipta® está contraindicado em pacientes com hipersensibilidade a qualquer β-lactâmico (incluindo penicilinas e cefalosporinas) ou inibidores da β-lactamase. Exclusivamente para uso via intravenosa. Uso adulto e pediátrico acima de 2 anos de idade. Venda sob prescrição médica. Só pode ser vendido com retenção da receita. Uso hospitalar

PIPTA É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
"SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO"

Material informativo exclusivo para a equipe de venda do medicamento.



O Laboratório Teuto desenvolveu um
**novo projeto de melhoria das suas
embalagens da linha hospitalar!**

Engajar a indústria para atuar ativamente em busca de formas de reduzir os problemas relacionados a medicamentos foi um dos objetivos do Terceiro Desafio Global.



**Acesse o
material completo.**

TEUTO
HOSPITALAR
Ciência viva pela saúde



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA



TEUTO —
HOSPITALAR
Ciência viva pela saúde

Flumazenil

(Antagonista de Benzodiazepinas)

Solução injetável 0,1mg/mL com 5 ampolas âmbar de 5mL - MS. 1.0370.0635.003-2

cód: 7352

O flumazenil é indicado para promover a reversão completa ou parcial dos efeitos sedativos centrais dos benzodiazepínicos. Usado em anestesia e em unidades de terapia intensiva, nos casos de anestesiologia e em terapia intensiva e manuseio de inconsciência de origem desconhecida.

Referência: Lanexat - Biopas

Lenazen

Flumazenil

(Antagonista de Benzodiazepinas)

Solução Injetável 0,1 mg/ml com 5 ampolas de 5ml - MS. 1.0370.0650.003-4

cód: 7361

Lenazen é indicado para promover a reversão completa ou parcial dos efeitos sedativos centrais dos benzodiazepínicos. É usado em anestesia e em unidades de terapia intensiva.

Referência: Lanexat - Aspen Pharma



TEUTO —
HOSPITALAR
Ciência viva pela saúde

Aciclovir

(Antivirótico)

Pó liofilizado para Sol. Inj. intravenosa 250mg com 50 frascos- ampolas - MS. 1.0370.0610.004-4

cód: 6639

Aciclovir é indicado para o tratamento de infecções pelo vírus Herpes simplex em recém-nascidos, crianças e adultos; tratamento de infecções pelo vírus Varicella zoster; profilaxia de infecções por Herpes simplex em pacientes imunocomprometidos e profilaxia de infecções pelo citomegalovírus (CMV) em pacientes transplantados de medula óssea.

Referência: Aciclovir- Teuto

Amicacina

(Antibiótico Aminoglicosídeo)

Solução Injetável 250mg/mL com 50 ampolas de 2mL - MS. 1.0370.0297.006-0

cód: 9070

Solução Injetável 50mg/mL com 50 ampolas de 2mL - MS. 1.0370.0297.002-8

cód: 9071

Sulfato de amicacina é indicado no tratamento a curto prazo de infecções graves causadas por espécies sensíveis de bactérias do tipo gram-negativas.

Referência: Sulfato de Amicacina - Teuto

Amoxicilina

(Antibiótico Penicilínico)

Cápsulas duras 500mg com 500 unidades - MS. 1.0370.0447.018-9

cód: 9206

A amoxicilina é um antibiótico de amplo espectro indicada para o tratamento de infecções bacterianas causadas por germes sensíveis à ação da amoxicilina.

Referência: Amoxil - Glaxosmithkline

Ampicilina

(Antibiótico Penicilínico)

Pó para solução injetável 1G com 50 unidades sem diluente - MS. 1.0370.0299.023-1

cód: 9215

Pó para solução injetável 500mg com 50 unidades sem diluente - MS. 1.0370.0299.019-3

cód: 9211

A ampicilina é um antibiótico indicado no tratamento de infecções por microrganismos sensíveis. É indicada em infecções causadas por germes Gram-positivos e Gram-negativos, sensíveis à ampicilina.

Referência: Ampicilina sódica - Teuto

Azitromicina

(Antibiótico Sistêmico)

500 mg pó liof. Sol. Inj. c/10 frascos - ampolas - MS. 1.0370.0755.003-5

cód: 4419

A azitromicina, é indicada para o tratamento de pneumonia adquirida na comunidade causada por organismos susceptíveis, incluindo Legionella pneumophila, em pacientes que requerem tratamento intravenoso inicial. A azitromicina di-hidratada também é indicada para o tratamento de doença inflamatória pélvica causada por organismos susceptíveis (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis), em pacientes que requerem tratamento intravenoso inicial.

Referência: Zitromax®- Pfizer

Bepoben

Benzilpenicilina Benzatina

(Antibiótico Penicilínico)

Pó para solução injetável 1.200.000 UI com 50 frascos-ampolas sem diluente - MS. 1.0370.0100.009-2

cód: 2505

Pó para suspensão injetável 600.000 UI com 50 frascos-ampolas sem diluente - MS. 1.0370.0100.005-1

cód: 2501

Bepoben® está indicado no tratamento de infecções por germes sensíveis à penicilina G.

Referência: Benzetacil - Eurofarma

Cefalexina

(Antibiótico Cefalosporínico)

Pó para suspensão oral 50mg/mL com 50 frascos de 60mL + 50 copos-medida - MS. 1.0370.0509.004-5

cód: 2888

Comprimido 500mg com 500 - MS. 1.0370.0382.006-2

cód: 3225

A cefalexina é indicada para o tratamento das seguintes infecções quando causadas por cepas de microrganismos sensíveis: Sinusites bacterianas; Otite média; Infecções do trato respiratório, da pele e tecidos moles, ósseas, do trato geniturinário e dentárias.

Referência: Keflex - Bagó



Cefepima

(Antibiótico Cefalosporínico)

Pó para solução injetável 1g com 50 frascos-ampola - MS. 1.0370.0646.003-2

cód: 9612

Pó para solução injetável 2G com 50 frasco-ampola - MS. 1.0370.0646.004-0

cód: 9614

Cloridrato de Cefepima pó para solução injetável é um antibiótico pertencente a classe das cefalosporinas para administração intramuscular ou intravenosa. Cefepima age contra uma grande variedade de bactérias, inibindo a formação da parede celular bacteriana.

Referência: Cloridrato de Cefepima- Biochimico

Ceftriaxona

(Antibiótico Cefalosporínico)

Pó para solução injetável 1G com 50 frascos-ampolas sem diluente - MS. 1.0370.0712.015-4

cód: 9632

Ceftriaxona dissódica é usada para tratar infecções causadas por microrganismos sensíveis à mesma, o que a torna um antibiótico capaz de eliminar uma grande variedade de microrganismos/bactérias responsáveis por diversos tipos de infecções.

Referência: Rocefin - Roche

Clocef

Cefepima

(Antibiótico Cefalosporínico)

Pó para solução injetável 1G com 50 frascos-ampolas - MS. 1.0370.0291.004-1

cód: 3226

Pó para solução injetável 2G com 50 frascos-ampolas - MS. 1.0370.0291.005-1

cód: 2859

Clocef® é indicado no tratamento, em adultos, para infecções do trato respiratório inferior, complicadas e não complicadas do trato urinário, pele e estruturas cutâneas, intra-abdominais, incluindo peritonite e infecções do trato biliar, ginecológicas, septicemia.

Referência: Cloridrato de Cefepima - Biochímico

Helmizol

Metronidazol

(Antiparasitário ginecológico)

Gel vaginal 100mg/g com 50 bisnagas de 50g + 500 aplicadores - MS. 1.0370.0071.008-8

cód: 0311

Helmizol® é indicado para o tratamento de tricomoníase.

Referência: Flagyl - Sanofi Medley

Nistatina

(Antimicótico) Creme vaginal 25.000UI com 50 bisnagas de 60g + 700 aplicadores - MS. 1.0370.0305.003-8

cód: 0716

A nistatina creme é indicada para o tratamento de candidíase vaginal (monilíase).

Referência: Canditrat® - Teuto

Nitrofurantoína

(Antibiótico Nitrofurânico)

Cápsulas gelatinosas duras 100mg com 280 - MS. 1.0370.0579.003-9

cód: 6624

A nitrofurantoína é um agente antibacteriano indicado no tratamento de infecções do trato urinário agudas e crônicas, tais como cistites, pielites, pielocistites e pielonefrites causadas por bactérias sensíveis à nitrofurantoína.

Referência: Macrodantina - Cosmed

Pipta

(Piperacilina sódica + Tazobactam sódico)

Pó liofilizado p/ sol. injetável 2 g + 250 mg c/10 fr. ampolas - MS. 1.0370.0788.027

cód: 4536

Pó liofilizado p/ sol. injetável 4 g + 0,5 g c/10 fr. ampolas - MS. 1.0370.0788.078

cód: 4537

É indicado para tratamento de infecções bacterianas sensíveis a ação do produto.

Referência: Tazocin - Wyeth

Poly B

(Antibiótico)

Pó Liof 500.000UI c/ 1 FR AMP- MS. RDC nº 483 de 19 de março de 2021, nº 516 de 2 de junho de 2021 e nº 524 de 8 de julho de 2021

cód: 4828

Indicado no tratamento de infecções do trato urinário, meninges e corrente sanguínea, causados por cepas suscetíveis de *Pseudomonas aeruginosa*. Também pode ser usado topicamente no tratamento de infecções oculares causadas por cepas suscetíveis de *Pseudomonas aeruginosa*. Pode ser indicado em infecções graves causadas por cepas suscetíveis dos seguintes organismos, quando drogas menos potencialmente tóxicas são ineficazes ou contraindicadas.

Referência: N/A – Este medicamento foi importado pelo Laboratório Teuto em caráter excepcional para uso exclusivo em estabelecimentos de saúde, devido emergência de saúde pública relacionada a pandemia de Covid-19. O mesmo possui regularização válida em seu país de origem e atende aos requisitos dispostos nas normas e padrões internacionais, além de ser fabricado em país reconhecido pela Anvisa conforme Art. 16 da lei 14.124 de 10 de março de 2020. Sua Importação e Comercialização estão de acordo com as diretrizes da Anvisa previstas nas RDC'S 483 de 19 de março de 2021 e 516/2021 e 524 de 8 de julho de 2021, que autorizam de forma extraordinária e temporária a importação e comercialização de medicamentos como este considerados críticos no enfrentamento da pandemia.

Vancomicina

(Antibiótico Sistêmico)

Pó liofilizado para solução injetável 500mg com 50 frascos-ampolas - MS. 1.0370.0461.003-7

cód: 1935

O cloridrato de vancomicina é indicado para o tratamento de infecções graves causadas por cepas de *Staphylococcus aureus* resistentes à metilicina (resistentes a betalactâmicos), mas suscetíveis à vancomicina.

Referência: Vacomicina CP - Antibióticos do Brasil



TEUTO —
HOSPITALAR
Ciência viva pela saúde

Androcortil

Hidrocortisona

(Glicocorticoide)

Pó liofilizado para solução injetável 100mg com 50 unidades sem diluente - MS. 1.0370.0463.004-6

cód: 2595

Pó liofilizado para solução injetável 500mg com 50 unidades sem diluente - MS. 1.0370.0463.006-2

cód: 2596

Androcortil® é indicado para o tratamento de doenças endócrinas como insuficiência adrenal aguda primária (Doença de Addison) ou secundária, insuficiência adrenal primária ou secundária crônica em pacientes submetidos a situações de estresse (cirurgias, infecções, trabalho de parto) e crise tireotóxica; Doenças reumatológicas e autoimunes; Anafilaxia; Asma; Choque séptico; Colite ulcerativa; Enxaqueca; Pós-cirurgia cardíaca; Pré-infusão de infliximabe; Pacientes politraumatizados e maturação do pulmão fetal.

Referência: Cortisonal - União Química

Cetofenid

Cetoprofeno

(Anti-inflamatório e Antirreumático)

Pó Liof. 100mg Solução Injetável com 50 frascos ampolas - MS. 1.0370.0777.004-3

cód: 6422

Solução Injetável 50mg/mL 2ML c/60 ampolas- MS. 1.0370.0775.003-4

cód: 4015

O cetoprofeno é um medicamento anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Este medicamento é destinado ao tratamento de inflamações e dores decorrentes de processos reumáticos e traumatismos, de dores em geral. Desta forma, cetoprofeno pode ser utilizado no tratamento da dor no pré e pós-operatório e outras patologias dolorosas.

Referência (100mg pó liof.): Cetoprofeno - Cristália

Referência (50mg/ml sol. inj.): Profenid IM- Sanofi-Aventis

Dexametasona

(Glicocorticoide)

Comprimido 4mg com 200- MS. 1.0370.0552.011-2

cód: 9458

Fosfato dissódico, Solução injetável 4mg/mL com 120 ampolas âmbar de 2,5mL - MS. 1.0370.0287.012-0

cód: 5198

O fosfato dissódico de dexametasona é indicado no tratamento de vários tipos de doenças, principalmente em afecções alérgicas e inflamatórias e outras doenças que respondem aos glicocorticoides como distúrbios reumáticos/artríticos (nas articulações), cutâneos (na pele), glandulares (nas glândulas), pulmonares, sanguíneos e gastrintestinais.

Referência: Decadron - Aché

Diclofenaco Potássico

(Anti-inflamatório)

Solução injetável 25mg/mL com 100 ampolas de 3mL - MS. 1.0370.0314.008-8

cód: 8985

Tratamento a curto prazo das seguintes condições de estados dolorosos inflamatórios pós-traumáticos, inflamação e tumefação, como por exemplo os causados por entorses; dor, tumefação e inflamação no pós-operatório, por exemplo após cirurgias ortopédicas ou odontológicas; cólica renal ou biliar.

Diclofenaco Sódico

(Anti-inflamatório)

Solução injetável 25mg/mL com 100 ampolas - MS. 1.0370.0306.008-4

cód: 9045

Este medicamento está indicado para o tratamento de exacerbação de formas degenerativas e inflamatórias de reumatismo; artrite reumatoide, espondilite anquilosante, osteoartrite, espondilartrite; Síndromes dolorosas da coluna vertebral; Reumatismo não articular; Crises agudas de gota; Cólica renal e biliar; Dor pós-operatória e pós-traumática, inflamação e edema.


Referência: Voltaren - Novartis Biociências



Nam blandit, felis eu ullamcor-




Etiam condimentum blandit nibh, eget elementum



Etiam elementum habitant malesuada sed lorem tempus eros ru Pellentes dolor eff sollicitud tortor. E sed nisi Nam bla tortor fa

Cras eget pretium enim


Aliquam ac facilis justo. Pellentesque maximus leo lorem, sed semper dolor efficitur ut. Sed sodales quam pharetra sollicitudin pellentesque. Aenean a magna tortor. Etiam sed sem eros.



Maecenas consectetur dignissim



Maecenas consectetur dignissim



TEUTO —
HOSPITALAR
Ciência viva pela saúde

Baclofen

Baclofeno

(Relaxante Muscular)

Comprimido 10mg com 20 unidades - MS. 1.0370.0111.001-7

cód: 2717

Baclofen® é usado para reduzir e aliviar a rigidez excessiva e/ou espasmos nos músculos que podem ocorrer em várias condições tais como a esclerose múltipla, doenças ou lesões na medula óssea, e certas doenças cerebrais.

Referência: Lioresal - Novartis Biociências

Cimetidina

(Antiulceroso)



Solução injetável 150mg/mL com 120 ampolas de 2mL - MS. 1.0370.0285.003-0

cód: 2659

Cimetidina é destinado ao tratamento de distúrbios do trato gastrointestinal superior nos quais a redução da secreção gástrica, a obtenção da remissão e a prevenção da recorrência sejam benéficas para o alívio sintomático como no tratamento agudo da úlcera duodenal, úlcera gástrica benigna, úlcera de boca anastomática e pós-cirúrgica e outros.

Referência: Cimetidina - Teuto

Hiospan Composto

Escopolamina + Dipirona

(Antiespasmódico)

Solução injetável 4mg/mL + 500mg/mL com 120 ampolas de 5mL - MS. 1.0370.0028.008-3

cód: 2842

Hiospan® Composto é indicado para o tratamento dos sintomas de cólicas intestinais, estomacais, urinárias, das vias biliares, dos órgãos sexuais femininos e menstruais.

Referência: Buscopan Composto - Cosmed

Omeprazol

(Antiulceroso)

Pó liofilizado p/ Sol. Inje. 40mg - C/ 25 frascos-amp. + 25 amp. de diluente com 10mL - MS. 1.0370.0771.005-9

cód: 4283

O omeprazol sódico por via intravenosa está indicado quando a administração do omeprazol na forma farmacêutica comprimidos está impossibilitada. O omeprazol sódico está indicado para o tratamento de: Úlcera péptica gástrica, ou duodenal; Esofagite de refluxo; Síndrome de Zollinger-Ellison; -Profilaxia de aspiração de conteúdo gástrico durante a anestesia geral em pacientes de risco.

Referência: Omeprazol Sódico - Eurofarma

Tolza IV

Pantoprazol Sódico

(Antiácido e Antiulceroso)

Pó Liof. 40MG Sol. Inj. C/25 frascos-amp. +25 amp. diluente com 10ML - MS. 1.0370.0778.003-0

cód: 2174

Tolza IV é indicado para o tratamento da úlcera péptica gástrica ou duodenal, das esofagites por refluxo moderadas ou graves, para o tratamento da síndrome de Zollinger-Ellison e de outras doenças causadoras de produção exagerada de ácido pelo estômago quando a via oral não for recomendada, a critério médico. Tolza IV também é indicado no tratamento de hemorragia digestiva alta (em complemento à terapia endoscópica), na prevenção do ressangramento e na profilaxia de sangramento agudo por úlcera de estresse.

Referência: Pantozol - Takeda





TEUTO —
HOSPITALAR
Ciência viva pela saúde

Aminofilina

(Broncodilatador)

Solução Injetável 24mg/mL c/50 ampolas 10mL - MS. 1.0370.0286.001-1

cód: 9073

A aminofilina está indicada para o alívio sintomático da asma brônquica aguda e para o tratamento do broncoespasmo reversível associado com bronquite crônica e enfisema.

Referência: Aminofilina - Hipolabor

Aerodini

Sulfato de Salbutamol

(Broncodilatador)

Aerossol 100mcg/dose- 200 doses - MS. 1.0370.0096.003-3

cód: 3703

Aerodini® spray é indicado para o controle e prevenção dos espasmos (contrações) dos brônquios durante as crises de asma, bronquite crônica e enfisema.

Referência: Aerolin - Glaxosmithkline

Ipratrópio

(Broncodilatador)

Solução inalatória 0,25mg/mL com 100 frascos de 20mL - MS. 1.0370.0466.002-6

cód: 2433

Brometo de ipratrópio é indicado para o tratamento de manutenção do broncoespasmo (falta de ar repentina) associado à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), que inclui bronquite crônica, enfisema.

Referência: Atrovent - Boehringer Ingelheim

Prometazina

(Anti-histamínico)

Comprimido revestido 25mg- c/200 - MS. 1.0370.0691.001-1

cód: 4054

Indicado no tratamento sintomático de todos os distúrbios incluídos no grupo das reações anafiláticas e alérgicas. Graças à sua atividade antiemética, é utilizado também na prevenção de vômitos do pós-operatório e das náuseas de viagens.

Referência: Fenegan - Sanofi Medley



TEUTO —
HOSPITALAR
Ciência viva pela saúde

Cordil

Cloridrato de Diltiazem

(*Antiaginoso e Anti-hipertensivo*)

Comprimido 60mg- c/50 - MS. 1.0370.0254.009-0

cód: 4276

Este medicamento é indicado para tratamento de pressão alta, angina pectoris (dores fortes no peito e falta de ar) e coronariopatias (problemas nos vasos que irrigam o coração) acompanhadas ou não de pressão alta e/ou taquicardia (palpitações constantes e duradouras).

Referência: Cardizem - Boehringer Ingelheim

Dobutamina

(*Simpaticomimético*)

Solução injetável 12,5mg/mL com 50 ampolas de 20mL - MS. 1.0370.0582.003-5

cód: 3637

Dobutamina é indicado para o tratamento de insuficiência cardíaca aguda.

Referência: Dobutrex - Antibióticos do Brasil

Dopamina

(*Vasoconstritor e Hipertensor*)

Solução Injetável 5mg/mL c/ 50 ampolas âmbar de 10mL - MS. 1.0370.0395.004-7

cód: 9074

Cloridrato de dopamina é indicado em estados de choque circulatório: choque cardiogênico pós-infarto, choque séptico, choque anafilático, retenção hidrossalina de etiologia variada.

Referência: Dopacris - Cristália

Furosemida

(*Diurético*)

Solução injetável 10mg/mL com 60 ampolas de 2mL - MS. 1.0370.0277.003-7

cód: 9067

Este medicamento é destinado ao tratamento de edemas devido a doenças cardíacas e doenças hepáticas (ascite), edemas devido a doenças renais; insuficiência cardíaca aguda, eliminação urinária reduzida devido à gestose, edemas cerebrais como medida de suporte; edemas devido a queimaduras; crises hipertensivas e indução de diurese forçada em envenenamentos.

Referência: Lasix - Sanofi Medley

Tarbet

Tartarato de Metoprolol


(*Betabloqueador*)

Solução injetável 1mg/mL. Embalagem contendo 5 ampolas com 5mL - MS. 1.0370.0769.002-3

cód: 4699

Tarbet® está indicado para: Distúrbios do ritmo cardíaco, especialmente taquicardia supraventricular. Infarto do miocárdio, confirmado ou suspeita.

Referência: Seloken - Astrazeneca



TEUTO —
HOSPITALAR
Ciência viva pela saúde

Amitriptilina

(Antidepressivo)

Comprimido revestido 25mg- c/100 - MS. 1.0370.0510.004-0

cód: 2444

O médico receitou o Amitriptilina para tratar uma ou mais das seguintes condições: depressão e enurese noturna (urinar na cama à noite). Amitriptilina possui propriedades ansiolíticas e sedativas (calmantes).

Referência: Amytril - Cristália

Bromazepam

(Ansiolítico)

Comprimidos 3mg- c/100 - MS. 1.0370.0495.004-0

cód: 1527

Comprimido 6mg- c/100 - MS. 1.0370.0495.008-3

cód: 1385

O bromazepam é indicado para ansiedade, tensão e outras queixas somáticas ou psicológicas associadas à síndrome de ansiedade. É indicado também para o uso adjuvante no tratamento de ansiedade e agitação associadas a transtornos psiquiátricos, como transtornos do humor e esquizofrenia.

Referência: Lexotan - Blanver

Carbamazepina

(Anticonvulsivante)

Comprimido 200mg com 500 unidades - MS. 1.0370.0472.011-8

cód: 3122

Administrada como monoterapia em pacientes com epilepsia – em particular, crianças e adolescentes- tem sido relatada a ação psicotrópica, incluindo um efeito positivo sobre os sintomas de ansiedade e depressão, tão bem quanto uma diminuição na irritabilidade e agressividade.

Referência: Tegretol - Novartis Biociências

Citalopram

(Antidepressivo)

Comprimido Revestido 20mg c/ 240 - MS. 1.0370.0611.010-4

cód: 3540

Citalopram é usado para tratar a depressão e, após a melhora, para prevenir a recorrência desses sintomas. É usado em tratamentos de longo prazo para prevenir a recorrência de novos episódios depressivos em pacientes que tem depressão recorrente. Também usado para o tratamento de pacientes com transtorno do pânico e para o tratamento do transtorno obsessivo compulsivo (TOC).

Referência: Cipramil – Lundbeck

Diazepam

(Ansiolítico)

Solução Injetável 10mg/2mL com 72 ampolas de 2mL - MS. 1.0370.0511.005-4

cód: 9075

Este medicamento é indicado no tratamento da ansiedade, estados epiléticos e convulsivos. No tratamento da insônia, como relaxante muscular e em medicação pré-anestésica.

Referência: Uni-Diazepam - União Química

Fenitoína

(Anticonvulsivante)

Comprimido 100mg c/ 100 - MS. 1.0370.0473.005-9

cód: 1458

Solução Injetável 50mg/mL c/72 ampolas de 5mL - MS. 1.0370.0507.004-4

cód: 1419

A fenitoína é destinada ao tratamento de crises convulsivas durante ou após neurocirurgia; crises convulsivas, crises tônico-clônicas generalizadas e crise parcial complexa (lobo psicomotor e temporal) e estado de mal epilético.

Referência Fenitoína 100mg cpr: Hidantal- Cosmed

Referência Fenitoína 50mg/mL amp: Fenital- Cristália

Fentanila

(Analgésico Narcótico)

Solução injetável 50mcg/mL (A1) inj amp 5mL c/ 5 - MS. 1.0370.0588.012-7

cód: 4523

Solução injetável 50mcg/ml (A1) inj amp 10mL c/ 5 - MS. 1.0370.0588.014-3

cód: 4525

O citrato de fentanila é indicado: para analgesia de curta duração durante o período anestésico (pré- medicação, indução e manutenção) ou quando necessário no período pós operatório imediato (sala de recuperação). Para uso como componente analgésico da anestesia geral e suplemento da anestesia regional. Para administração conjunta com neuroléptico na pré-medicação, na indução e como componente de manutenção em anestesia geral e regional. Para uso como agente anestésico único com oxigênio em determinados pacientes de alto risco, como os submetidos a cirurgia cardíaca ou certos procedimentos neurológicos e ortopédicos difíceis. Para administração epidural no controle da dor pós-operatória, operação cesariana ou outra cirurgia abdominal.

Referência: Rapifen - Antibióticos do Brasil

Fluoxetina

(Antidepressivo)

Cápsula gelatinosa dura 20mg com 70 - MS. 1.0370.0487.006-3

cód: 2572

Este medicamento é indicado para o tratamento da depressão, associada ou não a ansiedade, da bulimia nervosa, do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e do transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM), incluindo tensão pré-menstrual (TPM), irritabilidade e disforia.

Referência: Prozac - Eli Lilly

Lorazepam

(Ansiolítico)

Comprimido 2mg com 100 - MS. 1.0370.0494.004-5

cód: 2552

Lorazepam é indicado para o controle dos distúrbios de ansiedade ou para alívio, a curto prazo, dos sintomas da ansiedade ou da ansiedade associada com sintomas depressivos. Além do tratamento do componente ansiedade em estados psicóticos e depressão intensa e como medicação pré-operatória.

Referência: Lorax - Wyeth

Midazolam

(Hipnótico)

Solução Injetável 5mg/mL com 5 ampolas de 3mL - MS. 1.0370.0636.005-4

cód: 4130

Solução Injetável 1mg/mL com 5 ampolas de 5mL - MS. 1.0370.0636.001-1

cód: 7547

Solução Injetável 5mg/mL com 5 ampolas de 10mL - MS. 1.0370.0636.017-8

cód: 7523

Solução Injetável 5mg/mL com 50 ampolas de 10mL - MS. 1.0370.0636.019-4

cód: 6847

O midazolam injetável é indicado para induzir o sono em pacientes adultos, pediátricos, incluindo recém-nascidos, sendo utilizado exclusivamente em ambiente hospitalar como sedativo antes e durante de procedimentos diagnósticos ou terapêuticos com ou sem anestesia local.

Referência 1mg: Midazolam - Teuto 

Referência 5mg: Dormonid - Farmoquímica S/A

Propofol

(Anestésico parenteral)

Emulsão Injetável 10mg/ml com 5 frascos-ampolas 20mL - MS. 1.0370.0754.001-3

cód: 4531

Propofol, é indicado para indução e manutenção de anestesia geral em procedimentos cirúrgicos. Isto significa que propofol faz com que o paciente fique inconsciente ou sedado durante operações cirúrgicas ou outros procedimentos. O propofol pode também ser usado para a sedação de pacientes adultos ventilados que estejam recebendo cuidados de terapia intensiva. O propofol pode também ser usado para sedação consciente para procedimentos cirúrgicos e de diagnóstico.

Referência: Diprivan - Aspen Pharma

Tramadol

(Analgésico narcótico)

Cápsulas duras 50mg com 50- MS. 1.0370.0503.003-4

cód: 2601

Solução Injetável 50mg/ml com 60 ampolas de 2mL- MS. 1.0370.0502.006-3

cód: 9069

Solução Injetável 50mg/ml com 60 ampolas de 1mL- MS. 1.0370.0502.003-9

cód: 9068

O cloridrato de tramadol é indicado para alívio da dor de intensidade moderada a grave.

Referência: Tramal - Grünenthal do Brasil

Valproato de Sódio

(Anticonvulsivante)

Xarope 250mg/5ml com 50 frascos de 100mL + 50 copos-medida- MS. 1.0370.0465.002-0

cód: 2145

Valproato de sódio é indicado como monoterápico ou como terapia adjuvante ao tratamento de pacientes com crises parciais complexas, que ocorrem tanto de forma isolada ou em associação com outros tipos de crises.

Referência: Depakene - Abbott

TEUTO
HOSPITALAR
Ciência viva pela saúde

TEUTO

SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA



Tolza IV

(Pantoprazol Sódico)

É indicado para o tratamento da úlcera péptica gástrica ou duodenal (úlceras causadas pelo ácido do estômago em contato com o revestimento do estômago ou do início do intestino) e das esofagites por refluxo moderadas ou graves (doença causada pela volta do conteúdo do estômago para o esôfago) e para o tratamento da síndrome de Zollinger-Ellison e de outras doenças causadoras de produção exagerada de ácido pelo estômago quando a via oral não for recomendada, a critério médico. Também é indicado no tratamento de hemorragia digestiva alta (em complemento à terapia endoscópica), na prevenção do ressangramento e na profilaxia de sangramento agudo por úlcera de estresse. Referência: Pantozol EV (Takeda)

MS. 1.0370.0778 - Tolza IV - Pantoprazol - Pó Liofilo Sol. Inj. 40mg cx. c/ 25 Fr. de Saco + 25 Amp. DL 10ml.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Tratamento de úlcera péptica gástrica ou duodenal, das esofagites por refluxo moderadas ou graves e tratamento da síndrome de Zollinger-Ellison e de outras condições patológicas hipersecretórias quando a via oral não for recomendada. Tratamento de hemorragia digestiva alta (em complemento à terapia endoscópica) e para prevenção de ressangramento. Profilaxia de sangramento agudo por úlcera de estresse. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Tolza IV não deve ser usado por indivíduos que apresentem alergia * (hipersensibilidade) conhecida ao pantoprazol, aos demais componentes da fórmula. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS e PRECAUÇÕES: Tolza IV 40mg não é indicado em distúrbios gastrointestinais leves, * como por exemplo na dispepsia não-ulcerosa. A resposta sintomática ao pantoprazol não exclui a presença de malignidade gástrica. Em pacientes com disfunção hepática grave a dose diária deve ser reduzida para 20mg e as enzimas hepáticas precisam ser regularmente monitoradas. O tratamento diário com qualquer medicação ácido-supressora por períodos prolongados (vários anos) pode levar a uma má absorção da vitamina B12. A coadministração de pantoprazol não é recomendada com inibidores da protease do HIV para os quais a absorção é dependente do pH do ácido intragástrico. Reações cutâneas graves, incluindo eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson (SSJ), necrólise epidérmica tóxica (NET), reação medicamentosa com eosinofilia e sintomas sistêmicos (DRESS) e pustulose exantemática generalizada aguda (PGEAG) foram relatados. Os inibidores da bomba de prótons estão associados em casos raros com a ocorrência de lipúria em pacientes cutâneos subagudos. Tolza IV não deve ser administrado a * gestantes e lactantes, a menos que absolutamente necessário, uma vez que a experiência clínica sobre seu uso em mulheres nestas condições é limitada. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: pantoprazol pode alterar a absorção de medicamentos cuja biodisponibilidade seja dependente do pH intragástrico, como cetozanazol, atazanavir e neflavinir. O uso concomitante com altas doses de metotrexato pode elevar e prolongar os níveis séricos de metotrexato e/ou de seus metabólitos, causando eventual toxicidade. Pacientes tratados com pantoprazol e varfarina ou fempromona podem precisar ser monitorados para aumento do INR e tempo de protrombina. Os inibidores da CYP2C19, tais como a fluvoxamina, provavelmente aumentam a exposição sistêmica do pantoprazol. Os indutores da CYP2C19 podem diminuir a exposição sistêmica a pantoprazol. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO: A posologia padrão varia de 40mg a 80mg de Tolza IV uma a duas vezes ao dia, via intravenosa. Este medicamento deve ser administrado por um profissional de saúde e sob supervisão médica apropriada. A administração intravenosa de pantoprazol é recomendada apenas se a administração oral não for apropriada. Os dados sobre o uso intravenoso estão disponíveis até a administração por 7 dias. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Reações comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes): tromboflebite no local da injeção. Reações incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1%). Distúrbios do sono, cefaleia, boca seca, diarreia, náusea/vômito, inchaço e distensão abdominal, dor e desconforto abdominal, prisão de ventre, aumento nos níveis de enzimas do fígado, tontura, reações alérgicas como coceira e reações de pele (loziforme, rash e erupções), fraqueza, cansaço e mal-estar. Outras reações adversas mais raras podem ocorrer e não estão descritas na bula. 6. Uso intravenoso. Uso adulto. Venda sob prescrição médica. Venda proibida ao comércio, * dentre outros. A descrição completa dos possíveis efeitos colaterais pode ser consultada na bula do produto. 6. Uso intravenoso. Uso adulto. Proibida venda ao comércio. Uso restrito a hospitais.

TEUTO É UM MEDICAMENTO.
SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

Material informativo exclusivo para equipe de vendas do medicamento.

L I N H A D O T E M P O

EVOLUÇÃO TEUTO

1999 – 2024

TEUTO HOSPITALAR

Ciência viva pela saúde

O Teuto até 2013 apresentou os estudos de Bioequivalência junto à ANVISA para todos os produtos do seu portfólio.



Iniciamos o projeto Ciência Viva Pela Saúde contribuindo com os processos da assistência hospitalar.



Ingressamos no mercado de doenças complexas através da biotecnologia Teuto com o lançamento de produtos oncológicos biossimilares.



Laboratório Teuto é pioneiro e lança seus primeiros genéricos.



Investimentos para formação de equipe de qualificações internacionais.



1999

Inserção da categoria de genéricos no Brasil. Ano de expansão no qual Teuto ampliou o seu portfólio.



2000

Os medicamentos similares passam por uma adequação regulatória através da RDC 134/2003, que passa a exigir testes de bioequivalência e equivalência farmacêutica para todos os similares.



2003

Início da parceria com a multinacional Pfizer até 2017.

2010



2013

Nova instalação de sólidos/injetáveis.

2016



2019

Protagonismo do Teuto frente ao cenário de pandemia no país ampliando o portfólio e aumentando a produção de produtos com maior demanda durante a pandemia.

2020



2024

SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA



www.teutodigital.com.br



LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO - VP-7 módulo 11 Qd 13 - Daia - Anápolis-GO



/@teutooficial



@teutooficial



/laboratorioteuto



@labteuto



TEUTO: 77 ANOS DE COMPROMISSO COM A FAMÍLIA BRASILEIRA